

# Arbitel<sup>®</sup> AM

Amlodipine Besilate BP + Telmisartan BP

## Composition

**Arbitel<sup>®</sup> AM 5/40 tablet:** Each coated tablet contains Amlodipine Besilate BP 6.935 mg equivalent to 5 mg Amlodipine and Telmisartan BP 40 mg.

**Arbitel<sup>®</sup> AM 5/80 tablet:** Each coated tablet contains Amlodipine Besilate BP 6.935 mg equivalent to 5 mg Amlodipine and Telmisartan BP 80 mg.

## Pharmacology

**Arbitel<sup>®</sup> AM** is a preparation of Amlodipine and Telmisartan. Amlodipine is a dihydropyridine calcium channel blocker that inhibits the transmembrane influx of calcium ions into vascular smooth muscle and cardiac muscle. Amlodipine is a peripheral arterial vasodilator that acts directly on vascular smooth muscle to cause a reduction in peripheral vascular resistance and reduction in blood pressure. Telmisartan is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist. Angiotensin II is formed from angiotensin I in a reaction catalyzed by angiotensin-converting enzyme. Telmisartan blocks the vasoconstrictor and aldosterone-secreting effects of angiotensin II by selectively blocking the binding of angiotensin II to the AT<sub>1</sub> receptor in many tissues, such as vascular smooth muscle and the adrenal gland.

## Indication

**Arbitel<sup>®</sup> AM** is indicated-

- For the treatment of hypertension alone or with other antihypertensive agents.
- As initial therapy in patients likely to need multiple antihypertensive agents to achieve their blood pressure goals.

## Dose and administration

**Route of administration:** **Arbitel<sup>®</sup> AM** should be taken in oral route with or without food.

Initiate with **Arbitel<sup>®</sup> AM 5/40 mg** once daily. Patients requiring larger blood pressure reductions may be started on **Arbitel<sup>®</sup> AM 5/80 mg** once daily. Initial therapy with **Arbitel<sup>®</sup> AM** is not recommended in patients ≥ 75 years old or with hepatic impairment. Dosage may be increased after at least 2 weeks. Most of the antihypertensive effect is apparent within 2 weeks and maximal reduction is generally attained after 4 weeks. The maximum recommended dose of **Arbitel<sup>®</sup> AM** tablets is 10/80 mg once daily.

## Replacement therapy

Patients receiving amlodipine and telmisartan from separate tablets may instead receive **Arbitel<sup>®</sup> AM** tablets containing the same component doses once daily. When substituting for individual components, increase the dose of **Arbitel<sup>®</sup> AM** if blood pressure control has not been satisfactory.

## Add-on therapy for patients with hypertension not adequately controlled on antihypertensive monotherapy

**Arbitel<sup>®</sup> AM** tablets may be used to provide additional blood pressure lowering for patients not adequately controlled with amlodipine (or another dihydropyridine calcium channel blocker) alone or with telmisartan (or another angiotensin receptor blocker) alone. Patients treated with 10 mg amlodipine who experience any dose-limiting adverse reactions such as edema, may be switched to **Arbitel<sup>®</sup> AM 5/40 mg** tablets once daily, reducing the dose of amlodipine without reducing the overall expected antihypertensive response.

## Renal impairment

No initial dosage adjustment is required for patients with mild or moderate renal impairment. Titrate slowly in patients with severe renal impairment.

## Hepatic impairment

Monitor carefully and titrate slowly in patients with biliary obstructive disorders or hepatic insufficiency. Since patients with hepatic impairment have decrease clearance of amlodipine, start amlodipine or add amlodipine 2.5 mg to telmisartan. But here the lowest dose is 5/40 mg; therefore, initial therapy with **Arbitel<sup>®</sup> AM** tablets is not recommended in hepatically impaired patients.

## Contraindication

This combination is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to amlodipine or telmisartan or any of the components of the products.

## Warning and precaution

Avoid fetal or neonatal exposure. Correct any volume or salt depletion before initiating therapy. Observe for signs or symptoms of hypotension. Titrate slowly in patients with hepatic or severe renal impairment. Monitor for worsening in Heart Failure patients. Avoid concomitant use of an ACE inhibitor and angiotensin receptor blocker. Uncommonly, initiating a CCB in patients severe obstructive coronary artery disease may precipitate myocardial infarction or increased angina.

## Side effects

The most common side effect are peripheral edema, dizziness, hypotension and back pain.

## Use in pregnancy and lactation

**Pregnancy:** This combination can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. When pregnancy is detected or expected, discontinue this combination as soon as possible.

**Lactation:** There is no information regarding the presence of this combination or telmisartan in human milk, the effects on the breastfed infant, or the effects on milk production. Limited published studies report that amlodipine is present in human milk. Because of the potential for serious adverse reactions in the breastfed infant including hypotension, hyperkalemia and renal impairment, advise a nursing woman not to breastfeed during treatment with this combination.

## Use in children and adolescents

Safety and effectiveness of this combination in pediatric patients have not been established.

## Drug interaction

**Drug interaction with medication:** Do not co-administer aliskiren with this combination in patients with diabetes. Avoid use of aliskiren with this combination in patients with renal impairment (GFR < 60 ml/min). When telmisartan was co-administered with digoxin, median increases in digoxin peak plasma concentration (49%) and in trough concentration (20%) were observed. Reversible increases in serum lithium concentrations and toxicity have been reported during concomitant administration of lithium with angiotensin II receptor antagonists including telmisartan. Monitor renal function periodically in patients receiving telmisartan and NSAID therapy. Limit the dose of simvastatin in patients on amlodipine to 20 mg daily. Amlodipine may increase the systemic exposure of cyclosporine or tacrolimus when co-administered. Monitor for symptoms of hypotension and edema when amlodipine is co-administered with CYP3A4 inhibitors. Patients should be monitored for adequate clinical effect when amlodipine is co-administered with CYP3A4 inducers.

**Drug interaction with food and others:** Not applicable.

## Overdose

**Amlodipine:** Overdosage might be expected to cause excessive peripheral vasodilation with marked hypotension and possibly a reflex tachycardia. If massive overdose should occur, initiate active cardiac and respiratory monitoring. Frequent blood pressure measurements are essential.

**Telmisartan:** Limited data are available with regard to overdose in humans. The most likely manifestation of overdose with telmisartan would be hypotension, dizziness and tachycardia. If overdose occur, supportive treatment should be given.

## Storage

Store in a cool (below 25°C) & dry place protected from light. Keep away from the reach of children.

## Packing

**Arbitel<sup>®</sup> AM 5/40 tablet:** Carton of 30 tablets in blister pack.  
**Arbitel<sup>®</sup> AM 5/80 tablet:** Carton of 30 tablets in blister pack.

® Registered Trade Mark



**Advanced Chemical Industries Limited**  
7, Hajeegonj Road, Godynj  
Narayanganj, Bangladesh

030500/C

# আরবিটেল® এএম

এয়ামলোডিপিন বিসাইলেট বিপি + টেলমিসারটান বিপি

## উপাদান

আরবিটেল® এএম ৫/৪০ ট্যাবলেট প্রতি আবর্তিত ট্যাবলেট আছে এয়ামলোডিপিন বিসাইলেট বিপি ৬.৩৩৫ মিগ্রা যা ৫ মিগ্রা এয়ামলোডিপিন এর সমতুল্য এবং টেলমিসারটান বিপি ৪০ মিগ্রা।  
আরবিটেল® এএম ৫/৮০ ট্যাবলেট প্রতি আবর্তিত ট্যাবলেট আছে এয়ামলোডিপিন বিসাইলেট বিপি ৬.৩৩৫ মিগ্রা যা ৫ মিগ্রা এয়ামলোডিপিন এর সমতুল্য এবং টেলমিসারটান বিপি ৮০ মিগ্রা।

## ফার্মাকোলজি

আরবিটেল® এএম হলো এয়ামলোডিপিন এবং টেলমিসারটান এর কম্বিনেশন। এয়ামলোডিপিন হলো একটি ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যা ভাস্কুলার মসৃণ পেশী এবং কardiaয়ক পেশীতে ক্যালসিয়াম আয়নের ট্রান্সমেমব্রেনে প্রবেশে বাধা দেয়। এয়ামলোডিপিন হলো একটি পেরিফেরাল ধমনী ভেসোডাইলেটর যা সরাসরি ভাস্কুলার মসৃণ পেশীতে কাজ করে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমাতে এবং রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। টেলমিসারটান একটি নন-পেপটাইড এনজিওটেনসিন II রিসেপ্টর প্রতিবন্ধক। এনজিওটেনসিন রূপান্তরকারী এনজাইম দ্বারা অনুঘটকমুক্ত প্রতিক্রিয়াতে এনজিওটেনসিন II থেকে এনজিওটেনসিন II গঠিত হয়। টেলমিসারটান ভাস্কুলার মসৃণ পেশী এবং আড্রেনাল গ্রন্থির মতো অনেক টিস্যুতে AT<sub>1</sub> রিসেপ্টরের সাথে এনজিওটেনসিন II এর সিলেক্টিভ বন্ধন ব্যাহত করে এনজিওটেনসিন II এর ভেসোকাঙ্কিষ্টিক এবং অ্যাংডোটেস্টের নিয়ন্ত্রণ প্রভাবগুলিকে বাধা দেয়।

## নির্দেশনা

আরবিটেল® এএম নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত-

- উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা এক বা অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণির সাথে।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক গুরুত্বের প্রয়োজন হতে পারে এমন
- রোগীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেরাপি হিসাবে।

## সেবনমাত্রা ও প্রয়োজনবিধি

গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ আরবিটেল® এএম খাবারের আগে অথবা পরে মুখে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।  
আরবিটেল® এএম ৫/৪০ মিগ্রা করে দিনে একবার দিয়ে শুরু করতে হবে। যে সমস্ত রোগীর বেশি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তাদের আরবিটেল® এএম ৫/৮০ মিগ্রা দিয়ে শুরু করতে হবে। প্রাথমিক থেরাপি হিসাবে ২৭৫ বছর বয়সী রোগী বা যুক্তরাজ্য অকার্যকরিতা রোগীদের ক্ষেত্রে আরবিটেল® এএম নির্দেশিত নয়। কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পরে মাত্রার পরিমাপ বাড়ানো যেতে পারে। বেশিরভাগ আক্রমণহারটেনসিন প্রভাব ২ সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট হয় এবং সর্বাধিক হ্রাস সাধারণত ৪ সপ্তাহ পরে অর্জিত হয়। আরবিটেল® এএম ট্যাবলেটের সর্বাধিক মাত্রা হলো ১০/৮০ মিগ্রা করে দিনে একবার।

## রিপ্রেসেন্টে থেরাপি

যে সমস্ত রোগী পূর্ণকভাবে এয়ামলোডিপিন এবং টেলমিসারটান সেবন করছেন, তাদের ক্ষেত্রে রিপ্রেসেন্টে থেরাপি হিসাবে একই উপাদান মাত্রাব্যবহারী আরবিটেল® এএম দিনে একবার করে সেবন করতে পারে। পৃথক উপাদানগুলির প্রতিস্থাপন করার সময়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ সন্তোষজনক না হলে আরবিটেল® এএম এর মাত্রা বাড়াতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য আ্যচ-অনন্য থেরাপি হিসাবে যাদের অ্যান্টিহাইপারটেনসিনিক মনোথেরাপিতে পর্যাপ্তভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত হয়নি

রোগীদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এককভাবে এয়ামলোডিপিন (বা অন্য ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার) বা টেলমিসারটান (বা অন্য এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার) পর্যাপ্ত না হলে আ্যচ-অনন্য থেরাপি হিসাবে আরবিটেল® এএম নির্দেশিত। যে সমস্ত রোগীদের ১০ মিগ্রা এয়ামলোডিপিন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটায় যেমন-ইডিমা, তাদের ক্ষেত্রে আরবিটেল® এএম ৫/৪০ মিগ্রা করে দিনে একবার সেবনে প্রত্যাশিত রক্তচাপের লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে এয়ামলোডিপিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দূর করা সর্বমুখ্য।

## বৃদ্ধির অকার্যকরিতায়

মৃদু বা মাঝারি বৃদ্ধির অকার্যকরিতা রোগীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মাত্রার সমন্বয়ের প্রয়োজন নাই। গুরুত্বর বৃদ্ধির অকার্যকরিতা রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা ধীরে ধীরে টাইট্রেট করতে হবে।

## যকৃতের অকার্যকরিতায়

বিলাসারি অবনতিগত ডিসঅর্ডার বা যকৃতের অকার্যকরিতা রোগীদের সাধাধীন পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং মাত্রা ধীরে ধীরে টাইট্রেট করতে হবে। যেহেতু যকৃতের অকার্যকরিতা রোগীদের এয়ামলোডিপিন ক্লিয়ারেন্স কমে যায়, তাই এয়ামলোডিপিন শুরু করতে হবে বা টেলমিসারটানের সাথে এয়ামলোডিপিন ২.৫ মিগ্রা থেরাপি করতে হবে। কিন্তু এখানে সর্বনিম্ন মাত্রা ৫/৪০ মিগ্রা; তাই, যকৃতের অকার্যকরিতা রোগীদের ক্ষেত্রে আরবিটেল® এএম প্রাথমিক থেরাপি হিসাবে নির্দেশিত নয়।

## প্রতিনির্দেশনা

যাদের এয়ামলোডিপিন বা টেলমিসারটান বা এই গুরুত্বের অন্যান্য উপাদানের প্রতি অতিরিক্তসেন্সিভিলা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

## সাধনমাত্রা ও সচেতনতা

ক্রম বা নবজাতকদের এক্সপোজার এড়িয়ে চলতে হবে। থেরাপি শুরু করার আগে যেকোন দলনত বা লবণের ব্লাস সংশোধন করে নিতে হবে। হাইপোটেনশনের লক্ষণ বা উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যকৃত বা গুরুত্বর বৃদ্ধির অকার্যকরিতা রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা ধীরে ধীরে টাইট্রেট করতে হবে।

হবে। হার্ট ফেইলিউর রোগীদের অবস্থা যাতে খারাপের দিকে না যায় তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এপিই ইনহিবিটর এবং এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। গুরুত্বর অকস্টোজিক করোনারি ধমনী রোগের রোগীদের ক্ষেত্রে সিনসি দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলে ম্যাকারোজিডাল ইনকার্ভার বা একজাইমাই হওয়ার প্রবলতা বেড়ে যায়।

## পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হলো পেরিফেরাল ইডেমা, মাথা ঘোরা, হাইপোটেনশন এবং পিঠে ব্যথা।

## গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় গর্ভকালীন এই কম্বিনেশন সেবনে জন্মের ক্ষতি হতে পারে। যখন গর্ভাবস্থা সনাক্ত হয় বা প্রত্যাশিত হয়, তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কম্বিনেশনটি সেবন বন্ধ করতে হবে।

স্তন্যদানকালে মাতৃদুগ্ধ এই কম্বিনেশন বা টেলমিসারটানের উপস্থিতি, বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুর উপর প্রভাব বা দুধ উৎপাদনের উপর প্রভাব সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্য নেই। মাতৃদুগ্ধে এয়ামলোডিপিনের উপস্থিতির সীমিত কিছু গবেষণার রিপোর্ট রয়েছে। বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুর মধ্যে তীব্র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- হাইপোটেনশন, হাইপারকালিমিয়া এবং বৃদ্ধির অকার্যকরিতা হওয়ার সম্ভাবনার কারণে এই কম্বিনেশন দিয়ে চিকিৎসার সময় স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

## শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবহার ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

## গুরুত্বের প্রতিক্রিয়া

অন্য গুরুত্বের সাথে ডায়াবেটিস রোগীদের এই কম্বিনেশনের সাথে অ্যালিসকিরেন একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। বৃদ্ধির অকার্যকরিতা (GFR<৬০ মিলি/মিনিট) রোগীদের ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশনের সাথে অ্যালিসকিরেন ব্যবহার করা যাবে না। যখন টেলমিসারটানকে ডিজিটালের সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন ডিজিটালের পিক প্লাজমা ঘনত্ব (৪৯%) এবং ট্রফ ঘনত্ব (২০%) বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। টেলমিসারটানসহ এনজিওটেনসিন II রিসেপ্টর প্রতিবন্ধক এর সাথে লিথিয়ামের একত্রে ব্যবহার সিরামে লিথিয়ামের ঘনত্ব এবং লিথিয়াম বিষাক্ততা বৃদ্ধি ঘটায়। টেলমিসারটান এবং এনএসএআইডি থেরাপি গ্রহণকারী রোগীদের মাঝে মাঝে বৃদ্ধির কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করতে হবে। এয়ামলোডিপিন পাচ্ছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সিমডাস্টাটিনের মাত্রা দিনে ২০ মিগ্রা পর্যন্ত সীমিত করতে হবে। সাইটোপ্সোপারিন বা ডায়াগোলিমিগের সিস্টেমিক এক্সপোজার এয়ামলোডিপিন বাড়িয়ে দেবে। যখন এয়ামলোডিপিন এবং CYP3A4 ইনহিবিটরগুলি একত্রে ব্যবহার করা হয় তখন হাইপোটেনশন এবং ইডিমার লক্ষণগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। CYP3A4 ইডিউসারের সাথে এয়ামলোডিপিনের একত্রে ব্যবহার হলে পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল প্রভাবে জন্য রোগীদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।  
খাবার এবং অন্য কিছুস সাথে প্রয়োজ্য নয়।

## মাত্রাধিক্য

এয়ামলোডিপিন মাত্রাধিক্যের ফলে হাইপোটেনশন এবং সম্ভবত রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়াসহ অত্যধিক পেরিফেরাল ভেসোডায়েলেশন হতে পারে। যদি ব্যাপক মাত্রাধিক্য হয়, তাহলে সক্রিয় কardiaয়ক এবং বায়ুস্বস্ত্রের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সাথে ঘন ঘন রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে। টেলমিসারটান মাত্রাধিক্যের সীমিত তথ্য রয়েছে। টেলমিসারটানের মাত্রাধিক্যের ফলে হাইপোটেনশন, মাথা ঘোরা এবং ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে। মাত্রাধিক্য হলে লক্ষণ অনুযায়ী সহায়ক চিকিৎসা দিতে হবে।

## সরসঞ্চ

আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা (২৫° সে. এর নিচে) ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## প্যাকিং

আরবিটেল® এএম ৫/৪০ ট্যাবলেট প্রতি কার্টনে ৩০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে সরবরাহ করা হয়।

আরবিটেল® এএম ৫/৮০ ট্যাবলেট প্রতি কার্টনে ৩০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে সরবরাহ করা হয়।

## ® রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক



এডভান্সড কেমিক্যাল  
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড  
৭, হাট্টিংস রোড, গোসদানী  
নারায়ণপল্লী, বাংলাদেশ